

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】GI-2

申請日	2011/4/22	承認日	委員長	印
レジメン登録		仮承認日	承認者	印

CDDP+S-1 療法	病名	肝細胞癌	消化器内科	提出医	Dr
対象	切除不能な進行・再発の肝細胞癌				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)															
			1	5	8	10	15	20	22	25	...	35						
シスプラチン	60mg/m ²	div			○													
S-1	※	po(朝・夕)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

投与間隔・休薬期間等: 35日=1コース

【投与処方例(前投薬など)】

Day8~12は、体重測定を実施。1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

- day8**
- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】 ラクテック 500mL / div 3時間
 - ③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL+プロイメンド1V+アロキシ1V+デキサート12mg / div 30分
 - ④ メイン【赤-3】 ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
 - ⑤ メイン【赤-4】 20%マンニトール注射液 300mL /div 全開(15分)
 - ⑥ メイン【赤-5】 生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
 - ⑦ メイン【白-1】 ラクテック 500mL / div 3時間

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会 (無断転用禁止)

- ⑧ 【コネクタ1】 プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑨ メイン【白-2】 ラクテック 500mL / div 3時間

- day9.10**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
 - ② ラクテック 500mL / div 3時間
 - ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
 - ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
 - ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

- day11**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
 - ② ヴィーンD 500mL /div 2時間

制吐剤セット処方⑳

Day8～11 コントミン糖衣錠(12.5mg) 2錠(分2 朝・夕食後)

* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチン・S-1の投与量を変更すること
シスプラチン

Ccr47～60mL/min 75%Dose

Ccr31～45mL/min 50%Dose

Ccr30以下は禁忌。

S-1

Ccr60～80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量

Ccr40～59mL/min 原則として1段階減量

Ccr30～39mL/min 原則として2段階減量

Ccr30以下は禁忌

※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
$\sim < 1.25\text{m}^2$	40mg/回	30mg/回	25mg/回
$1.25\text{m}^2 \leq \sim < 1.5\text{m}^2$	50mg/回	40mg/回	30mg/回
$1.5\text{m}^2 \leq \sim$	60mg/回	50mg/回	40mg/回

当院患者治療目的以外は
使用不可

