

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】GY-01

| | | | |
|-------------------|------|-----|---|
| 申請日 | 承認日 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録日 2023/10/1 | 仮承認日 | 承認者 | 印 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|------|------|-----|
| AP(DXR+CDDP) | 病名 | 子宮体癌 | 産婦人科 | 提出医 |
| 対象 | 進行または再発子宮体癌 | | | |

| 薬剤商品名 (一般名) | 投与量 (mg/m ² 等) | 投与方法 (div.iv.po等) | 投与スケジュール(日) | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | | | | |
| ドキソルビシン | 60mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン | 50mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | | | | | |

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース

【投与処方例(前投薬など)】

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチンの投与量を変更すること

Ccr46~60mL/min 75%Dose

Ccr31~45mL/min 50%Dose

Ccr30以下は禁忌。

Day1~5は、体重測定を実施。開始時より1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

day1

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】ラクテック500mL / div 3時間
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg/ div 30分

- ④ メイン【赤-3】生理食塩液50mL /div 5分
- ⑤ メイン【赤-4】生理食塩液50mL+ドキシソルビシン /div 5分(空ボトルに入れる)
- ⑥ メイン【白-1】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑦ メイン【白-2】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
- ⑧ メイン【白-3】生理食塩液500mL+シスプラチン /div 2時間
- ⑨ メイン【黄-1】ラクテック500mL /div 3時間
- ⑩ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑪ メイン【黄-2】ラクテック500mL /div 3時間

day2.3.4

- ① 生理食塩水100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
- ② ラクテック 500mL /div 3時間
- ③ ヴィーンD 500mL /div 3時間
- ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑤ ラクテック 500mL /div 3時間

制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day1~4 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day1~4 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可