

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】GY-14N

| | | | |
|-------------------|------|-----|---|
| 申請日 | 承認日 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録日 2023/10/1 | 仮承認日 | 承認者 | 印 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-----|------|-----|
| PTX+CBDCA | 病名 | 卵巣癌 | 産婦人科 | 提出医 |
| 対象 | 卵巣癌の術前化学療法 (Neoadjuvant) | | | |

| 薬剤商品名 (一般名) | 投与量 (mg/m ² 等) | 投与方 法(div.iv.po 等) | 投与スケジュール(日) | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------------|-------------|---|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | | | | | | | |
| パクリタキセル | 175mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| カルボプラチン | AUC×6 | div | ○ | | | | | | | | | | | | | | |

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース
3~6コース行う

【投与処方例(前投薬など)】

※パクリタキセル投与中は、手足をクーリングする

※0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを使用

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキササート20mg / div 30分
- ③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-2】生理食塩液100mL / div 30分
- ⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液500mL+パクリタキセル /div 3時間
- ⑥ メイン【白】生理食塩液 250mL+カルボプラチン /div 1時間

制吐剤セット処方⑨

Day1 レスタミンコーワ錠10mg 5錠(治療の30分前)

Day2.3 デカドロン錠4mg 1錠(分1 朝食後)

Day1~4 プリンペラン5mg 3錠(分3 毎食後)

当院患者治療目的以外は
使用不可