

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】GY-15

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 2023/10/1	仮承認日	承認者	印

PTX+CBDCA+Bev	病名	卵巣癌	産婦人科	提出医
対象	化学療法未治療でStageⅢ以上の卵巣癌			

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	10	15	20	22	25	30							
パクリタキセル	175mg/m ²	div	○														
カルボプラチン	AUC×6	div	○														
アバスチン(ベバシズマブ)	15mg/kg	div	○														

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース

1コース

最大6コースまで 終了後はアバスチン維持療法(15mg/kg 3週間ごとに)を行う

【投与処方例(前投薬など)】

- ※アバスチン投与中は、タンパク尿・血圧測定を実施。
- ※パクリタキセル投与中は、手足をクーリングする
- ※0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用

- ① メインキープ【緑】生理食塩液 250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキササート20mg / div 30分
- ③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-2】生理食塩液100mL / div 30分
- ⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液500mL+パクリタキセル /div 3時間

- ⑥ メイン【白】生理食塩液 250mL+カルボプラチン /div 1時間
⑦ メイン【黄】生理食塩液100mL+アバスチン /div (初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮可)

※ 術後28日以内の場合、1クール目はアバスチン抜き

制吐剤セット処方⑨

Day1 レスタミンコーワ錠10mg 5錠(治療の30分前)

Day2.3 デカドロン錠4mg 1錠(分1 朝食後)

Day1~4 プリンペラン5mg 3錠(分3 毎食後)

当院患者治療目的以外は
使用不可