

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】GY-31N

申請日	2019/6/11	承認日	2019/7/8	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日	2019/6/18	承認者	印

GEM+CBDCA 療法	病名	卵巣癌	産婦人科	提出医
対象	卵巣癌の術前化学療法(Neoadjuvant)			

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)																			
			1	5	8	10	15	20	22	25	30											
ゲムシタビン	1000mg/m ²	div	○			○																
カルボプラチン	AUC×4	div	○																			

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース
最大6コースまで

【投与処方例(前投薬など)】

※腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、投与量を変更すること

ゲムシタビン

Ccr60以下では、代謝物のクリアランスが低下するため慎重投与

Day1

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液50mL /div 5分
- ④ メイン【赤-3】 5%ブドウ糖液100mL+ゲムシタビン / div 30分
- ⑤ メイン【白】 生理食塩液250mL+カルボプラチン /div 1時間

Day8

Day8

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+デキサート8mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】 5%ブドウ糖液100mL+ゲムシタビン / div 30分

制吐剤セット処方⑫

Day2.3 デカドロン錠4mg 1錠(分1 朝食後)

Day1~4 プリンペラン5mg 3錠(分3 毎食後)

当院患者治療目的以外は
使用不可