

中津市民病院化学療法プロトコール

【レジメンNo】H-10

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 (見直し 2020/3/16)	仮承認日	承認者	印

FCM 療法		病名	悪性リンパ腫	血液内科	医師名							
対象		悪性リンパ腫										
薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)									
			1	5	10	15	20	25	30			
エンドキサン (シクロホスファミド)	200mg/m ²	div	○	○	○							
ノバントロン (ミトキサントロン)	8mg/m ²	div	○									
フルダラ(フルダラビン)	40mg/m ²	po.	○	○	○							
投与間隔・休薬期間等:			28日=1コース ←—————→ 4コースまで 1コース									

【投与処方例(前投薬など)】

day1

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+アロキン 1V+デキサート12mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液500mL+エンドキサン /div 4時間
- ④ メイン【白】 生理食塩液100mL+ノバントロン /div 30分

day2,3

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+デキサート8mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液500mL+エンドキサン /div 4時間

※フルダラビン投与量

体表面積(m ²)	1日用量
0.89-1.13	40mg(4錠)
1.14-1.38	50mg(5錠)
1.39-1.63	60mg(6錠)
1.64-1.88	70mg(7錠)
1.89-2.13	80mg(8錠)
2.14-2.38	90mg(9錠)

※減量規定あり