

day2

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+ソル・メルコート50mg /div 30分(12時間毎に2回/日投与)
- ③ Y側管【水色】5%ブドウ糖液500mL+メイロン20mL /div 8時間
- ③' メイン【赤-2】生理食塩液500mL+シタラビン /div 2時間(12時間毎に2回/日投与)(③と同時に開始)
- ④ Y側管【水色】5%ブドウ糖液500mL+メイロン20mL /div 8時間
- ⑤ 【コネクタ1】ロイコボリン50mg /iv (MTX投与開始36時間後)
- ⑥ メイン【白-1】生理食塩液100mL+ソル・メルコート50mg /div 30分(12時間毎に2回/日投与)
- ⑦ メイン【白-2】生理食塩液500mL+シタラビン /div 2時間(12時間毎に2回/日投与)
- ⑧ Y側管【水色】5%ブドウ糖液500mL+メイロン20mL /div 8時間
- ⑨ 【コネクタ1】ロイコボリン15mg /iv (MTX投与開始42時間後)

day3

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② 【コネクタ1】ロイコボリン15mg /iv (MTX投与開始48時間後)
- ③ メイン【赤-1】生理食塩液100mL+ソル・メルコート50mg /div 30分(12時間毎に2回/日投与)
- ④ Y側管【水色】5%ブドウ糖液500mL+メイロン20mL /div 8時間
- ④' メイン【赤-2】生理食塩液500mL+シタラビン /div 2時間(12時間毎に2回/日投与)(④と同時に開始)
- ⑤ 【コネクタ1】ロイコボリン15mg /iv (MTX投与開始54時間後)
- ⑥ Y側管【水色】5%ブドウ糖液500mL+メイロン20mL /div 8時間
- ⑦ 【コネクタ1】ロイコボリン15mg /iv (MTX投与開始60時間後)
- ⑧ メイン【白-1】生理食塩液100mL+ソル・メルコート50mg /div 30分(12時間毎に2回/日投与)
- ⑨ メイン【白-2】生理食塩液500mL+シタラビン /div 2時間(12時間毎に2回/日投与)
- ⑩ Y側管【水色】5%ブドウ糖液500mL+メイロン20mL /div 8時間
- ⑪ 【コネクタ1】ロイコボリン15mg /iv (MTX投与開始66時間後)

day4

- ① ロイコボリン15mg /iv (MTX投与開始72時間後)

- ② ロイコボリン15mg /iv (MTX投与開始78時間後)
- ③ ロイコボリン15mg /iv (MTX投与開始84時間後)

備考

MTX(メソトレキサート)投与開始36時間後にロイコボリン注50mgを静注。

MTX投与開始42時間後から、ロイコボリン注15mgを6時間毎に8回静注。

MTX終了時 $>20\mu\text{mol/L}$ 、24時間後 $>1\mu\text{mol/L}$ 、48時間後 $>0.1\mu\text{mol/L}$ の場合はロイコボリン50mgへ増量。(0.1 $\mu\text{mol/L}$ 以下まで投与)
大量AraC(シタラビン)投与前日から投与翌日まで、角結膜炎予防のため、リンデロン点眼(4~6回/日)を行う。

MTXの排泄を促すために、メイロンによる尿のアルカリ化、補液による尿量確保を行う。

(尿pH7.0以下では、ダイアモックス250mg+5%ブドウ糖液100mLを点滴投与)

点眼液処方①

リンデロン点眼液(1日4回 両眼)シタラビンの投与前日朝から終了翌日まで

当院患者治療目的以外は
使用不可