

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】H-16

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 2023/10/1	仮承認日	承認者	印

R-Benda 療法	病名	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 マントル細胞リンパ腫	血液内 科	医師名					
対象 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫									
薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)						
			1	5	10	15	20	25	30
リツキシマブ	375mg/m ²	div	○						
ベンダムスチン	90mg/m ²	div	○	○					
投与間隔・休薬期間等:			28日=1コース 4~6コース						
			1コース						

【投与処方例(前投薬など)】

day1

レスタミンコーワ錠 (10) 4錠
カロナール (200) 2錠 } /po.リツキシマブ投与30分前

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+ソル・メルドロール125mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+リツキシマブ /div (1mg/mLになるよう薬剤科で調製)

day2

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL+ベンダムスチン /div 10分

day3

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤】生理食塩液50mL+ベンダムスチン /div 10分

※リツキシマブの速度

初回 最初の1時間(25mg/hr)次の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)
2回目以降 初回副作用軽微な場合は、
最初の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)

当院患者治療目的以外は
使用不可