

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】H-52

| | | | | | |
|---------|-----------|------|-----------|-----|---|
| 申請日 | 2023/5/8 | 承認日 | 2023/6/12 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録日 | 2023/10/1 | 仮承認日 | | 承認者 | 印 |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|-------|-----|----|
| GB(2～6コース目) 療法 | 病名 | 濾胞性リンパ腫 | 血液内 科 | 医師名 | Dr |
|----------------|----|---------|-------|-----|----|

| | |
|-----------|----------------|
| 対象 | CD20陽性の濾胞性リンパ腫 |
|-----------|----------------|

| 薬剤商品名 (一般名) | 投与量 (mg/m ² 等) | 投与方法 (div.iv.po等) | 投与スケジュール(日) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | | | |
| ガザイバ(オビヌツズマブ) | 1000mg/Body | div | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| トレアキシチン(ベンダムスチン) | 90mg/m ² | div | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | |

投与間隔・休薬期間等: 28日=1コース

1コース

【H-51】からの引き継ぎで本レジメン5コースまで(H-51.52合わせて6コースまで)

【投与処方例(前投薬など)】

2コース目以降

day1 レスタミンコーワ錠(10)4錠
 カロナール(200)2錠 } /po.ガザイバ投与30分前

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+ソル・メドロール80mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL/div 1時間
- ④ メイン【赤-3】 生理食塩液210mL+ガザイバ /div (全量250mLになるよう薬剤科で調製)
- ⑤ メイン【白-1】 生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキササート4mg/div 30分
- ⑥ メイン【白-2】 生理食塩液50mL+ベンダムスチン /div 10分(終了後メインの生理食塩液でウォッシュアウト)

day2

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤】 生理食塩液50mL+ベンダムスチン /div 10分(終了後メインの生理食塩液でウォッシュアウト)

※ガザイバの速度

初回 12mL/hrで30分点滴→25mL/hrで30分点滴→37mL/hrで30分点滴→50mL/hrで30分点滴

→62mL/hrで30分点滴→75mL/hrで30分点滴→87mL/hrで30分点滴→100mL/hrで投与 順調にいけばTotal 4時間15分かかる

2回目以降 初回副作用軽微な場合は、

25mL/hrで30分点滴→50mL/hrで30分点滴→75mL/hrで30分点滴→100mL/hrでその後投与 順調にいけばTotal 3時間15分かかる

【参考文献】ガザイバ点滴静注用適正使用ガイド、GALLIUM試験

当院患者治療目的以外は
使用不可