

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】H-54

| | | | | | |
|---------|------------|------|------------|-----|---|
| 申請日 | 2023/12/4 | 承認日 | 2023/12/11 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録日 | 2023/12/11 | 仮承認日 | | 承認者 | 印 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|------------|------|-----|----|
| BV+CHP | 病名 | 末梢性T細胞リンパ腫 | 血液内科 | 医師名 | Dr |
| 対象 | CD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫の一次治療 | | | | |

| 薬剤商品名 (一般名) | 投与量 (mg/m ² 等) | 投与方法 (div, iv, po 等) | 投与スケジュール(日) | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|---|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | | | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | |
| アドセトリス(プレニキチマブベドチン) | 1.8mg/kg | div | ○ | | | | | | | | | |
| ドキシソルビシン | 50mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | |
| エンドキサン (シクロホスファミド) | 750mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | |
| プレドニゾロン注あるいは錠 | 100mg/body | div or po. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース ←————→ 1コース
最大8コースまで

【投与処方例(前投薬など)】

アドセトリスはフィルター使用不可

(添付文書に記載がないが、メーカーDIセンターより治験段階でフィルターを使用してのデータがないので不可と確認) 2023.8.30

レスタミンコーワ錠(10)4錠 } /po.アドセトリス投与30分前
 カロナール(200)2錠 }

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+水溶性プレドニン10A /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL / 5分
- ④ Y側管【水色】生理食塩液100mL+注射用水(溶解用)+アドセトリス /div 30分(希釈後の濃度は0.4~1.2mg/mLとなるように調製)
(10.5mL/Vの注射用水で溶解し、その後希釈を行う)
- ⑤ メイン【赤-3】生理食塩液50mL+ドキシソルビシン /div 5分

⑥ メイン【白】生理食塩液500mL+エンドキサン /div 2時間

当院患者治療目的以外は
使用不可