

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】M-18

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 2023/10/1	仮承認日	承認者	印

wPTX+Bevacizumab療法	病名	乳癌	外科	提出医	Dr
対象	進行または再発乳癌				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)										
			1	5	10	15	20	25	30				
アバスチン(ベバシズマブ)	10mg/kg	div	○			○							
パクリタキセル	90mg/m ²	div	○		○	○							
投与間隔・休薬期間等: 28日=1コース													

【投与処方例(前投薬など)】 ※0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用

※パクリタキセル投与中は、手足をクーリングする

day1,15

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤】生理食塩液100mL+アバスチン /div (初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮可)
- ③ メイン【白-1】生理食塩液50mL+デキサート8mg /div 5分
- ④ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ⑤ メイン【白-2】生理食塩液 100mL /div 30分

- ⑥ メイン【白-3】5%ブドウ糖液250mL +パクリタキセル /div 1時間
注意 ③と⑤は必ず30分以上あけること。

day8

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
② メイン【赤-1】生理食塩液50mL+デキサート8mg /div 5分
③ 【コネクタ】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
④ メイン【赤-2】生理食塩液 100mL /div 30分
⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液250mL +パクリタキセル /div 1時間

注意 ②と④は必ず30分以上あけること。

<除外規定>脳転移症例、術後4週間以内、コントロール不良の心血管病変、中等量以上の抗凝固剤使用

制吐剤セット処方⑧:アレルギー防止目的
Day1、8、15 レスタミンコーワ錠(10) 5錠(治療の30分前)