

化学療法プロトコール

【レジメンNo】M-24

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 (見直し 2020/4/24)	仮承認日	承認者	印

Capecitabine+Trastuzumab療法	病名	乳癌	外科	提出医
対象 進行または再発乳癌				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)																														
			1	5	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#			
カペシタビン	1250mg/m ²	po	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハーセプチン (トラスツズマブ)	初回 4mg/kg	div	○																														
	2回目以降 2mg/kg	div																															
投与間隔・休薬期間等:			<p>21日=1コース ←—————→</p> <p>カペシタビン:2週内服1週休薬 1コース</p> <p>ハーセプチン:週1回毎週投与 2コース目</p>																														

【投与処方例(前投薬など)】

ジクロフェナクNa坐剤(12.5~50mg)挿肛(ハーセプチン初回量時)

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤】ハーセプチン+生理食塩液250mL /div (初回量(4mg/kg)90分、2回目以降量(2mg/kg)30分)

体表面積	カペシタビン1回用量※
$\sim < 1.33\text{m}^2$	1500mg
$1.33\text{m}^2 \leq \sim < 1.57\text{m}^2$	1800mg
$1.57\text{m}^2 \leq \sim < 1.81\text{m}^2$	2100mg
$1.81\text{m}^2 \leq \sim$	2400mg

当院患者治療目的以外は
使用不可