

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】M-27

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日	承認者
			印

Eribulin+Trastuzumab	病名	乳癌	外科	提出医	Dr
対象	HER2陽性の進行または再発乳癌				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div,iv,po 等)	投与スケジュール(日)									
			1	5	10	15	20	25	30			
ハーセプチン (トラスツズマブ)	初回8mg/kg	div	○									
	2回目以降 6mg/kg	div						○				
ハラヴェン(エリブリン)	1.4mg/m ²	div	○		○			○				○

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース

ハラヴェンは週1回2週連続投与し、3週目は休薬

1コース (Day 1-21) 2コース目 (Day 22-42)

【投与処方例(前投薬など)】

day1 ジクロフェナクNa坐剤(12.5~50mg)挿肛(ハーセプチン初回量時)

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL+ハラヴェン /div 5分
- ④ メイン【白】生理食塩液250mL+注射用水+ハーセプチン/div (初回量(8mg/kg)90分、2回目以降量(6mg/kg)30分)

注射用水は150mg:7.2mL、60mg:3mLで溶解

day8

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+デキサート8mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液50mL+ハラヴェン /div 5分

* 静脈炎予防のためにメインの生理食塩液でウォッシュアウトを行うこと

* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて投与量を変更すること

※ハラヴェン

Ccr15～50mL/min 1.1mg/m²

Ccr15以下は推奨がない。