

# 化学療法プロトコール

【レジメンNo】M-7

|         |                    |      |  |     |   |
|---------|--------------------|------|--|-----|---|
| 申請日     |                    | 承認日  |  | 委員長 | 印 |
| レジメン登録日 | (見直し)<br>2020/4/24 | 仮承認日 |  | 承認者 | 印 |

|           |           |    |    |     |
|-----------|-----------|----|----|-----|
| GEM 療法    | 病名        | 乳癌 | 外科 | 提出医 |
| <b>対象</b> | 進行または再発乳癌 |    |    |     |

| 薬剤商品名<br>(一般名) | 投与量<br>(mg/m <sup>2</sup> 等) | 投与方法<br>(div, iv, po<br>等) | 投与スケジュール(日)                    |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                |                              |                            | 1                              | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ゲムシタビン         | 1250mg/m <sup>2</sup>        | div                        | ○                              |   | ○  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投与間隔・休薬期間等:    |                              |                            | 21日=1コース<br>週1回投与を2週連続し、3週目は休薬 |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【投与処方例(前投薬など)】

\* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、投与量を変更すること

ゲムシタビン

Ccr60以下では、代謝物のクリアランスが低下するため慎重投与

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL + デキサート8mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】5%ブドウ糖液100mL + ゲムシタビン /div 30分