

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】MST-4

申請日	2022/7/12	承認日	2022/8/8	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日		承認者	印

AI	病名	悪性軟部肉腫	泌尿器科	医師名	Dr
対象	切除不能の悪性軟部肉腫				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div, iv, po等)	投与スケジュール(日)																			
			1	5	8	10	15	20	25	30												
イホマイド	2.5g/m ²	div	○	○	○	○																
ドキシルビシン	25mg/m ²	div	○	○	○																	
ジーラスタ	3.6mg/Day/コース	皮下注				○																

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース
6コースまで

←————— 1コース —————→

【投与処方例(前投薬など)】

治療開始前に、CVポート造設または中心静脈カテーテルを留置する。

ドキシルビシン450mg/m²以上では心毒性が出やすいため、心エコー、心電図を治療開始前、治療後も定期的に検査を行うこと。

Day1~5は、体重測定を実施。1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

利尿剤は、20%マンニトール注射液300mL 1袋(15分かけて)を基本であるが、最終的には主治医判断とする。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

※ウロミテキサン注は、イホマイドの1日量の20%相当量を1日3回投与(イホマイド直前、4時間後、8時間後)する。

イホマイド投与後してから、尿のpH測定を指示し、pHが酸性になった場合にはさらにメイロンを追加する。

day1

Y側管【水色-1】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間

Y側管【水色-2】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間

Y側管【水色-3】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間

Y側管【水色-4】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間

① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div

② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg / div 30分

③ 【コネクタ1】ウロミテキサン注 (500mg/m²) /iv 10分 ※

④ メイン【赤-2】生理食塩水500mL+イホマイド /div(閉鎖) 4時間

⑤ 【コネクタ1】ウロミテキサン注 (500mg/m²) /iv 10分 ※

⑥ メイン【白-1】ソリタT-1 500mL /div 2時間

⑦ メイン【白-2】生理食塩水250mL+ドキシソルビシン注 /div 2時間

⑧ 【コネクタ1】ウロミテキサン注 (500mg/m²) /iv 10分 ※

⑨ メイン【黄-1】ソリタT-1 500mL /div 2時間

day2.3

Y側管【水色-1】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間

Y側管【水色-2】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間

Y側管【水色-3】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間

Y側管【水色-4】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間

① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div

② メイン【赤-1】生理食塩液50mL+デキサート8mg / div 30分

③ 【コネクタ1】ウロミテキサン注 (500mg/m²) /iv 10分 ※

④ メイン【赤-2】生理食塩水500mL+イホマイド /div(閉鎖) 4時間

⑤ 【コネクタ1】ウロミテキサン注 (500mg/m²) /iv 10分 ※

- ⑥ メイン【白-1】ソリタT-1 500mL /div 2時間
- ⑦ メイン【白-2】生理食塩水250mL+ドキシソルビシン注 /div 2時間
- ⑧ 【コネクタ1】ウロミテキサン注 (500mg/m²) /iv 10分 ※
- ⑨ メイン【黄-1】ソリタT-1 500mL /div 2時間

day4

Y側管【水色-1】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間
Y側管【水色-2】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間
Y側管【水色-3】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間
Y側管【水色-4】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 4時間

- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg / div 30分
- ③ 【コネクタ1】ウロミテキサン注 (500mg/m²) /iv 10分 ※
- ④ メイン【赤-2】生理食塩水500mL+イホマイド /div(閉鎖) 4時間
- ⑤ 【コネクタ1】ウロミテキサン注 (500mg/m²) /iv 10分 ※
- ⑥ メイン【白-1】ソリタT-1 500mL /div 2時間
- ⑦ メイン【白-2】ソリタT-1 500mL /div 2時間
- ⑧ 【コネクタ1】ウロミテキサン注 (500mg/m²) /iv 10分 ※

day5

- ① ヴィーンD 500mL /div 4時間
- ② ラクテック 500mL /div 4時間

day6

ジーラスタ注3.6mg /皮下注

制吐剤セット処方⑭

DMがない場合

Day1～4 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day1～4 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

当院患者治療目的以外は
使用不可