


中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】P-1

申請日	2019/5/31	承認日	2019/6/10	委員長	印
レジメン登録	2019/6/18(見直し 2020/2/3)	仮承認日		承認者	印

リツキシマブ 療法	病名 難治性ネフローゼ症候群	小児 科	提出医	Dr
対象 頻回・再発型、ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	10	15	20	25	30								
リツキサン(リツキシマブ)	375mg/m ²	div	○														

投与間隔・休薬期間等: 単回投与 

1コース

*効果が乏しい場合には1週間ごとに投与を行う。
7日間=1コース

【投与処方例(前投薬など)】

*リツキサン投与30分前に内服

カロナール細粒(20%)もしくはカロナール錠 1回10mg/kg (MAX:300mg/body)

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② コネクタ1 生理食塩液4mL+ポラミン注5mg 1A /iv 5分 混ぜた濃度が1mg/mlとなる。

【注意！年齢に応じてポラミンの投与量が違います】必要量をはかり、投与。

2歳:0.4mg 3~4歳:0.6mg 5~7歳:0.8mg 8~11歳:1mg 12~14歳:1.2mg 15歳以上:2mg

- ③ メイン【赤-1】生理食塩液50mL+ソル・メドロール 2mg/kg /div 30分 (MAX:125mg)
- ④ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+リツキサン /div (1mg/mlになるよう薬剤科で調製)

※リツキサンの速度

初回	最初の1時間(25mg/hr)次の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)
2回目以降	初回副作用軽微な場合は、 最初の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)