

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-C01

申請日	2016/6/6	承認日	委員長	印	
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日	2016/6/6	承認者	印

Capecitabine+BV	病名	大腸癌	外科	提出医
対象	切除不能進行再発大腸癌で強力な治療を行わない患者			

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)															
			1	5	10	15	20	25	30									
アバスチン(ベバシズマブ)	7.5mg/kg	div	○															
カペシタビン	※	po(朝)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	※	po(夕)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース																		

【投与処方例(前投薬など)】

- アバスチン投与中は、タンパク尿・血圧測定を実施。
- 治療期間中は、手足症候群予防として、治療開始時より保湿剤の処方を行う。
- 症状出現時は、Grade別に対応・治療薬を処方。皮膚障害時には、薬剤師に相談。

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② 【メイン赤】生理食塩液100mL+アバスチン /div (初回90分、2回目60分、3回目以降30分で可)

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、カペシタビンの投与量を変更すること

Ccr30~50mL/min 75%Dose

Ccr30以下は禁忌

※カペシタビンの内服量 2000mg/m²/Day

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準は添付文書を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
~<1.36m ²	1,200mg(4錠)	900mg(3錠)	600mg(2錠)
1.36m ² ≦~<1.41m ²	1,500mg(5錠)		
1.41m ² ≦~<1.51m ²			
1.51m ² ≦~<1.66m ²	1,800mg(6錠)	1,200mg(4錠)	900mg(3錠)
1.66m ² ≦~<1.81m ²			
1.81m ² ≦~<1.96m ²	2,100mg(7錠)	1,500mg(5錠)	1200mg(4錠)
1.96m ² ≦~<2.11m ²			
2.11m ² ≦~			