

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-C23

申請日	2010/4/13	承認日	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日	承認者	印

CapeOX+Bevacizumab	病名	大腸癌	外科	提出医
対象	切除不能・進行再発大腸癌			

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	10	15	20	25	28	30							
アバスチン(ベバシズマブ)	7.5mg/kg	div	○														
オキサリプラチン	130mg/m ²	div	○														
カペシタビン	※	po(朝)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カペシタビン	※	po(夕)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース

←————— 1コース —————→

【投与処方例(前投薬など)】

- *アバスチン投与中は、タンパク尿・血圧測定を実施。
- *手足症候群予防として、保湿剤を処方すること。

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤】生理食塩液100mL+アバスチン /div (初回90分、2回目60分、3回目以降30分で可)
- ③ メイン【白-1】5%ブドウ糖液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4.95mg/div 30分
- ④ メイン【白-2】5%ブドウ糖液500mL+オキサリプラチン+デキサート4mg /div 2時間

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、カペシタビンの投与量を変更すること

Ccr30~50mL/min 75%Dose

Ccr30以下は禁忌

※カペシタビンの内服量 2000mg/m²/Day

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
~<1.36m ²	1,200mg(4錠)	900mg(3錠)	600mg(2錠)
1.36m ² ≦~<1.41m ²	1,500mg(5錠)		
1.41m ² ≦~<1.51m ²		1,200mg(4錠)	
1.51m ² ≦~<1.66m ²			900mg(3錠)
1.66m ² ≦~<1.81m ²	1,800mg(6錠)	1,500mg(5錠)	
1.81m ² ≦~<1.96m ²	2,100mg(7錠)		1200mg(4錠)
1.96m ² ≦~<2.11m ²			
2.11m ² ≦~			

参考文献 JCO 2008 ; 26 2006