

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-C31

申請日	2017/3/15	承認日	委員長	印
レジメン登録	2017/3/15(見直し 2020/3/2)	仮承認日	承認者	印

Bevacizumab+TFTD	病名	大腸癌	外科	提出医	Dr
------------------	----	-----	----	-----	----

対象 切除不能進行再発大腸癌の二次治療以降

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	10	15	20	25	28	30							
アバスチン(ベバシズマブ)	7.5mg/kg	div	○				○										
ロンサーフ	※	po(朝)	○	○	○	○	○	○	○	○							
ロンサーフ	※	po(夕)	○	○	○	○	○	○	○	○							

投与間隔・休薬期間等: 28日 = 1コース

←————— 1コース —————→

【投与処方例(前投薬など)】

アバスチン投与中は、タンパク尿(UPC比)・血圧測定を実施。

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤】生理食塩液100mL + アバスチン / div (初回90分、2回目60分、3回目以降30分で可)

ロンサーフ制吐剤セット処方

Day1～5、Day8～12 ナゼアOD(0.4mg) 1錠(分1 朝食後)

Day1～5、Day8～12 デカロドン(0.5mg) 4錠(分1 朝食後)

*Day1.8のナゼアOD、デカドロンは夕食後。Day2.9以降は朝食後とする。

【ロンサーフの内服に関して】

ロンサーフの腎機能時における投与量はデータがなく不明

※ロンサーフの内服量は体表面積から算出すること

体表面積	1回用量※
$\sim < 1.07\text{m}^2$	35mg
$1.07\text{m}^2 \leq \sim < 1.23\text{m}^2$	40mg
$1.23\text{m}^2 \leq \sim < 1.38\text{m}^2$	45mg
$1.38\text{m}^2 \leq \sim < 1.53\text{m}^2$	50mg
$1.53\text{m}^2 \leq \sim < 1.69\text{m}^2$	55mg
$1.69\text{m}^2 \leq \sim < 1.84\text{m}^2$	60mg
$1.84\text{m}^2 \leq \sim < 1.99\text{m}^2$	65mg
$1.99\text{m}^2 \leq \sim < 2.15\text{m}^2$	70mg
$2.15\text{m}^2 \leq \sim$	75mg

参考文献

KSCC1602試験