

中津市民病院化学療法レジメン  
【レジメンNo】S-C32

申請日	2017/3/31	承認日	委員長	印
レジメン登録	2017/3/31(見直し 2020/3/2)	仮承認日	承認者	印

Bevacizumab+S-1	病名	大腸癌	外科	提出医	Dr
<b>対象</b>	切除不能進行再発大腸癌で強力な治療を行わない患者				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)																				
			1	5	10	15	20	25	28	29	30	42											
アバスチン(ベバシズマブ)	5mg/kg	div	○						○												○	..	
S-1	※	po(朝)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S-1	※	po(夕)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

投与間隔・休薬期間等: 42日=1コース

【投与処方例(前投薬など)】

アバスチン投与中は、タンパク尿・血圧測定を実施。

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤】生理食塩液100mL+アバスチン /div (初回90分、2回目60分、3回目以降30分で可)

\*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、S-1の投与量を変更すること

- Ccr60~80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量
- Ccr40~59mL/min 原則として1段階減量
- Ccr30~39mL/min 原則として2段階減量

Ccr30以下は禁忌

※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
$\sim < 1.25\text{m}^2$	40mg/回	30mg/回	25mg/回
$1.25\text{m}^2 \leq \sim < 1.5\text{m}^2$	50mg/回	40mg/回	30mg/回
$1.5\text{m}^2 \leq \sim$	60mg/回	50mg/回	40mg/回

当院患者治療目的以外は  
使用不可