

側管 day1

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】ラクテック500mL /div 3時間
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg /div 30分
- ④ メイン【赤-3】生理食塩液50mL / 5分
- ⑤ メイン【赤-4】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑥ メイン【赤-5】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
- ⑦ メイン【赤-6】生理食塩液500mL+シスプラチン /div 2時間
- ⑧ メイン【白-1】ラクテック500mL /div 3時間
- ⑨ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑩ メイン【白-2】ラクテック500mL /div 3時間

メイン day2.3.4

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン10mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】ラクテック500mL /div 3時間
- ④ メイン【赤-3】ヴィーンD 500mL /div 3時間
- ⑤ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑥ メイン【赤-4】ラクテック500mL /div 3時間
- ⑦ メインの生理食塩液をすべて流す

メイン day5

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤】ラクテック500mL /div 3時間
- ③ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ④ メインの生理食塩液をすべて流す

制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day1～4 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day1～4 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可

参考資料:JCOG9906試験

当院患者治療目的以外は
使用不可