

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-E5

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録 2018/1/9(見直し 2020/2/28)	仮承認日	承認者	印

PTX 療法	病名	食道癌	外科	提出医	折田 Dr
<b>対象</b> 再発または遠隔転移を有する食道癌 二次化学療法					

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法	投与スケジュール(日)																				
			1	5	8	10	15	20	#	25	#	30	35	36	...	49							
パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	div	○				○					○					○					○	...

投与間隔・休薬期間等: 週1回投与を6週連続し、2週間休薬=1コース

2週間休薬

← 1コース →

【投与処方例(前投薬など)】※0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルター(PVCフリー使用)

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液50mL+デキササート8mg /div 5分
- ③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-2】生理食塩液100mL /div 30分
- ⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液250mL+パクリタキセル /div 1時間

注意 ⑤開始まで③から必ず30分以上あけること。

制吐剤セット処方⑧:アレルギー防止目的  
レスタミンコーワ錠(10) 5錠(治療の30分前)

参考資料:Cancer Chemother Pharmacol 2011; 67: 1265