

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-G15

申請日	2015/9/3	承認日	2015/9/3	委員長	印
レジメン登録	2015/9/28(見直し) 2020/2/28)	仮承認日		承認者	印

wPTX + Ramucirumab 療法	病名	胃癌	外科	提出医	Dr
対象	治癒切除不能な進行・再発胃癌 二次治療以降				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)																			
			1	5	8	10	15	20	21	25	28	30										
サイラムザ(ラムシルマブ)	8mg/kg	div	○						○													
パクリタキセル	80mg/m ²	div	○		○				○													
投与間隔・休薬期間等: 28日=1コース																						

【投与処方例(前投薬など)】※0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルター(PVCフリー使用)

*サイラムザ投与中は、タンパク尿・血圧測定を実施。

*パクリタキセルはアルコールを含むため、アルコール不耐の確認。治療日は自動車運転不可であることを確認。

Day1.15

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液50mL + デキサート8mg /div 5分
- ③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-3】生理食塩液250mL + サイラムザ / div 1時間
- ⑤ メイン【白-1】生理食塩液50mL /div 10分
- ⑥ メイン【白-2】5%ブドウ糖液250mL + パクリタキセル /div 1時間

Day8

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液50mL＋デキサート8mg /div 5分
- ③ 【コネクタ】 ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL /div 30分
- ⑤ メイン【赤-3】 5%ブドウ糖液250mL＋パクリタキセル /div 1時間
注意 ⑤開始まで③から必ず30分以上あけること。

制吐剤セット処方⑧:アレルギー防止目的
Day1.8.15 レスタミンコーワ錠(10) 5錠(治療の30分前)

提出文献: サイラムザ添付文書

RAINBOW試験

Lancet Oncol 2014; 15: 1224