

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-G25

申請日	2019/7/18	承認日	2019/8/19	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日		承認者	印

S-1+DTX(Adjuvant)	病名	胃癌	外科	提出医	Dr
<b>対象</b>	R0手術/StageⅢの胃癌に対する術後補助化学療法				

薬剤商品名 (カタカナ)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div,iv,po等)	投与スケジュール(日)																			
			1	5	10	15	20	22	25	30												
ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	div	○																			
S-1	※	po(朝)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	※	po(夕)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース

←————— 1コース —————→

1コース目はS-1のみの内服(2週間内服、1週間休薬)  
 2~7コース目:S-1+DTX療法  
 8コース目以降:S-1のみの内服(4週内服2週休薬) 最長1年まで

【投与処方例(前投薬など)】※ドセタキセル投与中は、手足をクーリングする

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】5%ブドウ糖液250mL+ドセタキセル /div 1時間

制吐剤セット処方⑦:むくみ抑え目的  
 Day2.3 デカドロン0.5mg 4錠(分1 朝食後)

\* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、S-1の投与量を変更すること

Ccr60～80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量

Ccr40～59mL/min 原則として1段階減量

Ccr30～39mL/min 原則として2段階減量

Ccr30未満は禁忌

### ※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
～<1.25m <sup>2</sup>	40mg/回	30mg/回	25mg/回
1.25m <sup>2</sup> ≦～<1.5m <sup>2</sup>	50mg/回	40mg/回	30mg/回
1.5m <sup>2</sup> ≦～	60mg/回	50mg/回	40mg/回

参考文献 J Clin Oncol. 2019 May 20;37(15):1296-1304