



- ① メインルート【緑】 生理食塩液250mL / div
- ②       メイン【赤】 生理食塩液250mL+注射用水+ハーセプチン /div 初回90分、2回目以降30分  
                  注射用水は150mg:7.2mL、60mg:3mLで溶解
- ③       メイン【白-1】 生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキササート12mg / div 30分
- ④       メイン【白-2】 生理食塩液50mL / 5分
- ⑤       メイン【白-3】 ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑥       メイン【白-4】 マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
- ⑦       メイン【白-5】 生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
- ⑧       メイン【黄-1】 ラクテック 500mL / div 3時間
- ⑨       【コネクタ1】 プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑩       メイン【黄-2】 ラクテック 500mL / div 3時間

### Day2.3

- ① 生理食塩液100mL+デキササート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
- ② ラクテック 500mL / div 3時間
- ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
- ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

### Day4

- ① 生理食塩液100mL+デキササート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
- ② ヴィーンD 500mL /div 2時間

#### 制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day1~4 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会<無断転用禁止>

Day1～4 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)  
 コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可

\*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチン・カペシタビンの投与量を変更すること

シスプラチン Ccr46～60mL/min 75%Dose

Ccr30～45mL/min 50%Dose

Ccr30未満は禁忌。

カペシタビン Ccr30～50mL/min 75%Dose

Ccr30未満は禁忌

※カペシタビンの内服量 2000mg/m<sup>2</sup>/Day

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
～<1.36m <sup>2</sup>	1,200mg(4錠)	900mg(3錠)	600mg(2錠)
1.36m <sup>2</sup> ≦～<1.41m <sup>2</sup>	1,500mg(5錠)		
1.41m <sup>2</sup> ≦～<1.51m <sup>2</sup>		1,200mg(4錠)	
1.51m <sup>2</sup> ≦～<1.66m <sup>2</sup>			900mg(3錠)
1.66m <sup>2</sup> ≦～<1.81m <sup>2</sup>	1,800mg(6錠)		
1.81m <sup>2</sup> ≦～<1.96m <sup>2</sup>	2,100mg(7錠)		
1.96m <sup>2</sup> ≦～<2.11m <sup>2</sup>		1,500mg(5錠)	
2.11m <sup>2</sup> ≦～			1200mg(4錠)