

注射用水は150mg:7.2mL、60mg:3mLで溶解

- ③ メイン【白-1】生理食塩液50mL /div 10分
- ④ メイン【白-2】5%ブドウ糖液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4mg /div 30分
- ⑤ メイン【白-3】5%ブドウ糖液500mL+オキサリプラチン+デキサート4mg /div 2時間

制吐剤セット処方④

Day2.3 デカドロン錠4mg 1錠(分1 朝食後)

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、S-1の投与量を変更すること

Ccr60~80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量

Ccr40~59mL/min 原則として1段階減量

Ccr30~39mL/min 原則として2段階減量

Ccr30未満は禁忌

※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
~<1.25m ²	40mg/回	30mg/回	25mg/回
1.25m ² ≤~<1.5m ²	50mg/回	40mg/回	30mg/回
1.5m ² ≤~	60mg/回	50mg/回	40mg/回

提出文献: KSCC1501B試験

*胃癌における切除不能な進行・再発に対してL-OHPの承認用法・用量は130mg/m²だが、SOX療法では100mg/m²が推奨されている。