



- ⑨ 【コネクタ1】 プリンペラン注射液10mg /iv 5分  
⑩ メイン【白-2】 ラクテック 500mL / div 3時間

### day9.10

- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分  
② ラクテック 500mL / div 3時間  
③ ヴィーンD 500mL / div 3時間  
④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分  
⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

### day11

- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分  
② ヴィーンD 500mL /div 2時間

### 制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day8~11 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day8~11 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可

\* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチン・S-1の投与量を変更すること  
シスプラチン

Ccr46~60mL/min 75%Dose

Ccr30~45mL/min 50%Dose

Ccr30未満は禁忌。

S-1

Ccr60~80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量

Ccr40~59mL/min 原則として1段階減量

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会<無断転用禁止>

Ccr30～39mL/min 原則として2段階減量

Ccr30未満は禁忌

※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
～<1.25m <sup>2</sup>	40mg/回	30mg/回	25mg/回
1.25m <sup>2</sup> ≤～<1.5m <sup>2</sup>	50mg/回	40mg/回	30mg/回
1.5m <sup>2</sup> ≤～	60mg/回	50mg/回	40mg/回

参考文献：SPIRITS試験；Lancet Oncol. 2008 Mar; 9 (3) : 215-21.