

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】T-13

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録 2023/10/1	仮承認日 2008/7/27	承認者	印

S-1 + CDDP	病名	非小細胞肺癌	呼吸器外科	医師名	Dr
対象 未治療・既治療・術後再発の非小細胞肺癌					

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)													
			1	5	10	15	20	25	30							
シスプラチン	60mg/m ²	div			○											
S-1	※ 40mg/m ²	po(朝・夕)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

投与間隔・休薬期間等: 28日=1コース

6コースまで

1コース

【投与処方例(前投薬など)】

Day1~5は、体重測定を実施。1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

S-1はDay1-21まで内服。2週休薬(副作用がない場合は1週休薬にしてもよい)

コースカウントは最短の28日=1コースにしている。

- day8① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液250mL / div 1時間
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL + アロカリス1V + パロノセトロン1V + デキサート12mg / div 30分

- ④ メイン【赤-3】生理食塩液50mL / 5分
- ⑤ メイン【赤-4】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑥ メイン【赤-5】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
- ⑦ メイン【赤-6】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
- ⑧ メイン【白-1】ラクテック 500mL / div 3時間
- ⑨ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑩ メイン【白-2】ラクテック 500mL / div 3時間

day9.10 ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分

- ② ラクテック 500mL / div 3時間
- ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
- ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

day11 ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分

- ② ヴィーンD 500mL /div 3時間

制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day8~11 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day8~11 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可

* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチン・S-1の投与量を変更すること

シスプラチン

Ccr46～60mL/min 75%Dose

Ccr31～45mL/min 50%Dose

Ccr30以下は禁忌。

S-1

Ccr60～80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量

Ccr50mL/min以下は基準がないため、適宜減量

※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
～<1.25㎡	40mg/回	30mg/回	25mg/回
1.25㎡≦～<1.5㎡	50mg/回	40mg/回	30mg/回
1.5㎡≦～	60mg/回	50mg/回	40mg/回