



Ccr46～60mL/min 正常人と同じ  
Ccr45mL/min以下は投与しないこと

## Day1

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+1V+パロノセトロン1V+デキサート4mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+オプジーボ /div 30分
- ④ メイン【白-1】生理食塩液50mL /div 30分
- ⑤ メイン【白-2】生理食塩液20mL+ヤーボイ /div 30分(生食50mlのボトル使用)(1～4mg/mlの濃度になるよう希釈)
- ⑥ メイン【黄】生理食塩液100mL+ペメトレキセド /div 10分
- ⑦ メイン【青】生理食塩液250mL+カルボプラチン /div 1.5時間

## Day22

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+オプジーボ /div 30分
- ④ メイン【白】生理食塩液100mL+ペメトレキセド /div 10分
- ⑤ メイン【黄】生理食塩液250mL+カルボプラチン /div 1.5時間

### 制吐剤セット処方④

Day2.3.23.24 デカドロン4mg 1錠(分1 朝食後)

ペメトレキセド投与の1週間以上前～ペメトレキセド最終投与の22日目まで  
パンビタン末 0.5mg/日  
メチコバール 1mg 筋注(9週間ごと)