


中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】T-9

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-----|---|
| 申請日 | 承認日 2008/7/27 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録 2008/7/27(見直し2020/4/24) | 仮承認日 | 承認者 | 印 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-------|-----|----|
| CDDP+UFT (UP) 療法 | 病名 | 非小細胞肺癌 | 呼吸器外科 | 医師名 | Dr |
| 対象 | | 非小細胞肺癌 | | | |

| 薬剤商品名 (一般名) | 投与量 (mg/m ² 等) | 投与方法 (div.iv.po等) | 投与スケジュール(日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UFT | 400~600mg/body | 経口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シスプラチン | 60mg/m ² | div | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース 

【投与処方例(前投薬など)】

* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチンの投与量を変更すること

Ccr47~60mL/min 75%Dose

Ccr31~45mL/min 50%Dose

Ccr30以下は禁忌。

Day1~5は、体重測定を実施。1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

day8 ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div

- ② メイン【赤-1】ラクテック500mL / div 3時間
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+プロイメンド1V+アロキシ1V+デキサート12mg /div 30分
- ④ メイン【赤-3】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑤ メイン【赤-4】20%マンニトール注射液 300mL /div 全開(15分)
- ⑥ メイン【赤-5】生理食塩液500mL+シスプラチン /div 2時間
- ⑦ メイン【白-1】ラクテック500mL / div 3時間
- ⑧ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑨ メイン【白-2】ラクテック500mL / div 3時間

- day9.10**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
 - ② ラクテック 500mL / div 3時間
 - ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
 - ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
 - ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

- day11**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
 - ② ヴィーンD 500mL /div 2時間

制吐剤セット処方⑳

Day8~11 コントミン糖衣錠(12.5mg) 2錠 分2(朝・夕食後)