

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】T-Thy01

|        |           |      |           |     |   |
|--------|-----------|------|-----------|-----|---|
| 申請日    | 2008/7/27 | 承認日  | 2008/7/27 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録 | 2023/10/1 | 仮承認日 |           | 承認者 | 印 |

|           |                 |     |       |     |    |
|-----------|-----------------|-----|-------|-----|----|
| ADOC      | 病名              | 胸腺腫 | 呼吸器外科 | 医師名 | Dr |
| <b>対象</b> | SatgeIVまたは再発胸腺腫 |     |       |     |    |

| 薬剤商品名<br>(一般名)         | 投与量<br>(mg/m <sup>2</sup> 等)      | 投与方法<br>(div,iv,po等) | 投与スケジュール(日) |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                        |                                   |                      | 1           | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ドキシソルビシン               | 40mg/m <sup>2</sup>               | div                  | ○           |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シスプラチン                 | 50mg/m <sup>2</sup>               | div                  | ○           |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| オンコビン(ビンクリスチン)         | 0.6mg/m <sup>2</sup><br>(最大2mgまで) | iv                   |             | ○ |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エンドキサン<br>(シクロフォスファミド) | 700mg/m <sup>2</sup>              | div                  |             | ○ |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース

【投与処方例(前投薬など)】必ず、CVポートを留置。末梢からの点滴禁止！

\* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチンの投与量を変更すること

Ccr46~60mL/min 75%Dose

Ccr31~45mL/min 50%Dose

Ccr30以下は禁忌

Day1~5は、体重測定を実施。1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

- day1**
- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
  - ② メイン【赤-1】生理食塩液250mL /div 1時間
  - ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg /div 30分
  - ④ メイン【赤-3】生理食塩液50mL/div 5分
  - ⑤ メイン【赤-4】生理食塩液50mL+ドキシソルビシン /div 5分
  - ⑥ メイン【白-1】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
  - ⑦ メイン【白-2】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
  - ⑧ メイン【白-3】生理食塩液500mL+シスプラチン /div 2時間
  - ⑨ メイン【黄-1】ラクテック500mL /div 3時間
  - ⑩ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
  - ⑪ メイン【黄-2】ラクテック500mL /div 3時間

- day2**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン10mg /div 30分
  - ② ラクテック500mL /div 3時間
  - ③ ヴィーンD 500mL /div 3時間
  - ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
  - ⑤ ラクテック500mL /div 3時間

- day3**
- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
  - ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン10mg /div 30分
  - ③ 【コネクタ1】生理食塩液20mL+オンコビン /iv 5分

- ④ メイン【赤-2】ラクテック500mL /div 3時間
- ⑤ メイン【赤-3】ヴィーンD 500mL / div 3時間
- ⑥ 【コネクタ2】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑦ メイン【赤-3】ラクテック500mL /div 3時間

- day4**
- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
  - ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL＋デキサート8mg /div 30分
  - ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL＋エンドキサン /div 30分(閉鎖)

#### 制吐剤セット処方⑩

DMがない場合

Day1～6 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day1～6 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可