# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】UR-11

| | | | |
|---|---|---|---|
| 申請日　2015/2/19 | 承認日　2015/4/13 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録　2015/2/20(見直し 2019/11/26) | 仮承認日 | 承認者 | 印 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| カバジタキセル　療法 | 病名　前立腺癌 | 泌尿器　科 | 提出医　Dr |
| **対象** | 去勢抵抗性の前立腺癌 | | |

| 薬剤商品名（一般名） | 投与量（mg/m²等） | 投与方法（div.iv.po等） | 投与スケジュール（日） 1 5 10 15 20 25 30 |
|---|---|---|---|
| ジェブタナ(カバジタキセル) | 25　mg/m² | div | ○ |
| ジーラスタ皮下注（ペグフィルグラスチム） | 3.6mg/コース | sc | ○ |
| プレドニゾロン錠5mg | 10mg/Day | po | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |

投与間隔・休薬期間等：　21日＝1コース

1コース

【投与処方例（前投薬など）】※0.2μmのインラインフィルターを使用(PVCフリー使用)

**day1**　① メインキープ【緑】生理食塩液250mL　/ div

② メイン【赤-1】生理食塩液100mL＋デキサート8mg＋ ポララミン注5mg　1A　/div　30分

③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg　1A　/iv 5分

④ メイン【赤-2】生理食塩液250mL＋ジェブタナ　/div 1時間

**day3**　① ジーラスタ皮下注3.6mg　/sc（ジェブタナ投与終了後24時間以降）

（内服薬）　連日経口内服

プレドニゾロン錠5mg　　2錠（分2　朝・昼食後）

＊ジェブタナの点滴は、朝・昼食後のステロイド内服の間に挟むようにする。

（やむおえず点滴1コース目の場合のみ昼・夕食後でも可）

当院患者治療目的以外は使用不可

中津市立中津市民病院　がん化学療法委員会　＜無断転用禁止＞