

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】UR-20

| | | | | | |
|--------|------------|------|------------|-----|---|
| 申請日 | 2019/12/26 | 承認日 | 2020/1/20 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録 | 2020/1/9 | 仮承認日 | 2019/12/28 | 承認者 | 印 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|-----|----|
| M-VAC(術前) 療法 | 病名 | 尿路上皮癌 | 泌尿器 科 | 提出医 | Dr |
| 対象 | 浸潤性尿路上皮癌の術前化学療法 | | | | |

| 薬剤商品名 (一般名) | 投与量 (mg/m ² 等) | 投与方法 (div.iv.po等) | 投与スケジュール(日) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|---|----|----|----|----|----|----|---|--|--|--|--|
| | | | 1 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | | | | | |
| メソトレキサート (メソトレキサート) | 30mg/m ² | div | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| エクザール(ビンブラスチン) | 3mg/m ² | div | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| アドリアマイシン | 30mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン | 70mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | | | | |

投与間隔・休薬期間等: 28日=1コース
2コースまで

←————— 1コース —————→

【投与処方例(前投薬など)】

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、投与量を変更すること

シスプラチン

Ccr47~60mL/min 75%Dose

Ccr31~45mL/min 50%Dose

Ccr30以下は禁忌。

メソトレキサート

Ccr16~60mL/min 50%Dose

Ccr15以下は禁忌

Day1～5は、体重測定を実施。1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。
腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

- day1**
- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】 ヴィーンD 500mL+メイロン静注7%(20mL) 2A / div 3時間
 - ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+メソトレキサート /div 30分
 - ④ メイン【白-1】ラクテック500mL / div 3時間
 - ⑤ メイン【白-2】ラクテック 500mL / div 3時間

- day2**
- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロキシ1V+デキサート12mg / div 30分
 - ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL+エクザール /div 5分
 - ④ メイン【白-1】生理食塩液50mL+アドリアマイシン /div 5分
 - ⑤ メイン【黄-1】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
 - ⑥ メイン【黄-2】20%マンニトール注射液 300mL /div 全開(15分)
 - ⑦ メイン【黄-3】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
 - ⑧ メイン【青-1】ラクテック 500mL / div 3時間
 - ⑨ 【コネクタ1】 プリンペラン注射液10mg /iv 5分
 - ⑩ メイン【青-2】ラクテック 500mL / div 3時間

- day3.4**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
 - ② ラクテック 500mL / div 3時間
 - ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
 - ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
 - ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

- day5**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
 - ② ヴィーンD 500mL /div 2時間

- day15.22① メインルート【緑】 生理食塩液250mL / div
② メイン【赤-1】 ヴィーンD 500mL+メイロン静注7%(20mL) 2A / div 3時間
③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL+メソレキサート /div 30分
④ メイン【白-1】 生理食塩液50mL+エクザール /div 5分

制吐剤セット処方②⑥

| | |
|--------|-------------------------------|
| Day2 | アプレピタント(125) 1C(抗がん剤の1時間前) |
| Day3、4 | アプレピタント(80) 1Cap(分1 朝食後) |
| Day2~5 | コントミン糖衣錠(12.5mg) 2錠(分2 朝・夕食後) |

当院患者治療目的以外は
使用不可