



Day1～5は、体重測定を実施。1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。  
腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

- day1**
- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
  - ② メイン【赤-1】 ヴィーンD 500mL+メイロン静注7%(20mL) 2A / div 3時間
  - ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+メソトレキサート /div 30分
  - ④ メイン【白-1】ラクテック500mL / div 3時間
  - ⑤ メイン【白-2】ラクテック 500mL / div 3時間

- day2**
- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
  - ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロキシ1V+デキサート12mg / div 30分
  - ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL+エクザール /div 5分
  - ④ メイン【白-1】生理食塩液50mL+アドリアマイシン /div 5分
  - ⑤ メイン【黄-1】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
  - ⑥ メイン【黄-2】20%マンニトール注射液 300mL /div 全開(15分)
  - ⑦ メイン【黄-3】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
  - ⑧ メイン【青-1】ラクテック 500mL / div 3時間
  - ⑨ 【コネクタ1】 プリンペラン注射液10mg /iv 5分
  - ⑩ メイン【青-2】ラクテック 500mL /div 3時間

- day3.4**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
  - ② ラクテック 500mL / div 3時間
  - ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
  - ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
  - ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

- day5**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
  - ② ヴィーンD 500mL /div 2時間

- day15.22① メインルート【緑】 生理食塩液250mL / div  
② メイン【赤-1】 ヴィーンD 500mL+メイロン静注7%(20mL) 2A / div 3時間  
③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL+メソトレキサート /div 30分  
④ メイン【白-1】 生理食塩液50mL+エクザール /div 5分

**制吐剤セット処方②⑥**

Day2	アプレピタント(125) 1C(抗がん剤の1時間前)
Day3、4	アプレピタント(80) 1Cap(分1 朝食後)
Day2~5	コントミン糖衣錠(12.5mg) 2錠(分2 朝・夕食後)

当院患者治療目的以外は  
使用不可