中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】UR-33

申請日 2022/9/15	承認日	委員長	印
レジメン登録 2022/10/17	仮承認日	承認者	印

Pembro(6week)+Axitinib	病名 腎細胞癌	泌尿器 科	医師名 Dr
対象	根治切除不能または転移性の腎細胞癌 一次治療		

薬剤商品名（一般名）	投与量（mg/㎡等）	投与方法（div.iv.po等）	投与スケジュール（日） 1 5 8 10 15 20 … 42
インライタ(アキシチニブ)	※10mg～20mg/Day	po	○ ○
キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	400mg/Body	div	○

投与間隔・休薬期間等： 42日＝1コース

1コース

【投与処方例（前投薬など）】**インラインフィルターを使用する**

インライタ投与中は、タンパク尿・血圧測定を実施。

手足症候群予防のために、開始時より保湿剤の処方を行う。

小手術は7日後、大手術では14～21日後より開始。ただし、術後補助化学療法は認められていない。

① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div

② メイン【赤】生理食塩液100mL＋キイトルーダ /div 30分

（最終濃度が1～10mg/mlとなるよう希釈）

＊減量は認められていない

※インライタは1回5mg 1日2回(朝・夕食後)内服。患者さんの状態により1回10mg 1日2回まで増量できる。

1コース目Day1のみケモ開始時間により、昼食後になることがある。

当院患者治療目的以外は使用不可

参考文献：KEYNOTE-426試験

Rini BI et al.N Engl J Med 2019; 380 1116-1127

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会 ＜無断転用禁止＞