


中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】UR-36

申請日	2023/3/22	承認日	委員長	印
レジメン登録	2023/4/10	仮承認日	承認者	印

DTX+PSL+Darolutamide	病名	前立腺癌	泌尿器科	提出医	Dr
<b>対象</b>	遠隔転移を有する前立腺癌				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)																			
			1	5	10	15	20	22	25	30												
ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	div	○																			
ニューベクオ(ダロルタミド)	1200mg/Day	po	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プレドニゾロン錠5mg	10mg/Day	po	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース 

DTXは最大6コースまで

ADT (LH-RHアゴニスト/アンタゴニスト又は精巣摘出術)の併用も可能

【投与処方例(前投薬など)】※ドセタキセル投与中は、手足をクーリングする

- ① メインルート【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+デキササート8mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】 5%ブドウ糖液 250mL+ドセタキセル /div 1時間

プレドニゾロン錠5mg 2錠(分2 朝・昼食後)

\*ドセタキセルの点滴は、朝・昼食後のステロイド内服の間に挟むようにする。

(やむおえず点滴1コース目の場合のみ昼・夕食後でも可)

ニューベクオ300mg 4錠(分2 朝・夕食後)の内服