

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】UR-07

|                  |              |     |   |
|------------------|--------------|-----|---|
| 申請日              | 承認日 2012/2/9 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録 2023/10/1 | 仮承認日         | 承認者 | 印 |

|                      |             |       |        |
|----------------------|-------------|-------|--------|
| GEM+CDDP(Day15なし) 療法 | 病名 尿路上皮癌    | 泌尿器 科 | 提出医 Dr |
| <b>対象</b>            | 転移・再発の尿路上皮癌 |       |        |

| 薬剤商品名<br>(一般名)       | 投与量<br>(mg/m <sup>2</sup> 等) | 投与方法<br>(div,iv,po等) | 投与スケジュール(日) |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |                              |                      | 1           | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ゲムシタビン               | 1000mg/m <sup>2</sup>        | div                  | ○           |   |   |    | ○  |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| シスプラチン               | 70mg/m <sup>2</sup>          | div                  | ○           |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース |                              |                      |             |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 【投与処方例(前投薬など)】

\*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、投与量を変更すること

### シスプラチン

Ccr46~60mL/min 75%Dose

Ccr31~45mL/min 50%Dose

Ccr<30禁忌。または、カルボプラチンレジメンに変更。

### ゲムシタビン

Ccr60以下では、代謝物のクリアランスが低下するため慎重投与

Day1~5は、体重測定を実施。開始時より1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

day1 ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div

- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】5%ブドウ糖液100mL+ゲムシタビン / div 30分
- ④ メイン【白-1】ラクテック 500mL / div 3時間
- ⑤ メイン【白-2】ラクテック 500mL / div 3時間

**day2**

- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL / div 5分
- ④ メイン【赤-3】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑤ メイン【赤-4】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
- ⑥ メイン【赤-5】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
- ⑦ メイン【白-1】ラクテック 500mL / div 3時間
- ⑧ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑨ メイン【白-2】ラクテック 500mL / div 3時間

**day3.4**

- ① 生理食塩水100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
- ② ラクテック 500mL / div 3時間
- ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
- ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

**day5**

- ① 生理食塩水100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
- ② ヴィーンD 500mL /div 2時間

**day8**

- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div

- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL + デキサート8mg / div 30分  
③ メイン【赤-2】5%ブドウ糖液100mL + ゲムシタビン / div 30分

### 制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day2～5 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day2～5 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可

当院患者治療目的以外は  
使用不可