

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】UR-09

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録 2023/10/1	仮承認日	承認者	印

TIP 療法	病名	精巣腫瘍	泌尿器 科	提出医	Dr
対象	精巣腫瘍の救済化学療法				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)												
			1	5	10	15	20	25	30						
パクリタキセル	200mg/m ²	div	○												
イホマイド(イフォスファミド)	1.5g/m ²	div		○	○	○									
シスプラチン	25mg/m ²	div		○	○	○									
フィルグラスチム	75 μg	sc			○	○	○	○	○	○	○				

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース
4コースまで

【投与処方例(前投薬など)】※0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルター(PVCフリー使用)

治療開始前に、CVポート造設または中心静脈カテーテルを留置する。

Day1~5は、体重測定を実施。1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

利尿剤は、20%マンニトール注射液300mL 1袋(15分かけて)を基本であるが、最終的には主治医判断とする。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

※ウロミテキサン注は、イホマイドの1日量の20%相当量を1日3回投与(イホマイド直前、4時間後、8時間後)する。

イホマイド投与後してから、尿のpH測定を指示し、pHが酸性になった場合にはさらにメイロンを追加する。

- day1
- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】生理食塩液50mL+デキササート20mg /div 5分
 - ③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
 - ④ メイン【赤-2】生理食塩液100mL /div 30分
 - ⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液500mL+パクリタキセル /div 2時間

- day2**
- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 2時間
 - ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4mg / div 30分
 - ④ 【コネクタ1】ウロミテキサン 300mg/m² (⑤の直前) /iv 5分 側管
 - ⑤ メイン【赤-3】生理食塩水500mL+イホマイド /div 2時間(閉鎖式器具使用)
 - ⑥ メイン【白-1】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
 - ⑦ メイン【白-2】マンニトールS注射液 300mL /div 全開で(15分)
 - ⑧ メイン【白-3】生理食塩水500mL+シスプラチン /div 2時間
 - ⑨ 【コネクタ1】ウロミテキサン 300mg/m² (④開始から4時間後) /iv 5分 側管
 - ⑩ メイン【黄-1】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 2時間
 - ⑪ メイン【黄-2】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 2時間
 - ⑫ 【コネクタ1】ウロミテキサン 300mg/m² (④開始から8時間後) /iv 5分 側管

*ウロミテキサンの投与量(体表面積別)

≦1.6m ²	400mg/回
1.6~2.0m ²	500mg/回
2.0m ² ≦	600mg/回

- day3.4.5**
- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 2時間
 - ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+デキサート4mg / div 30分
 - ④ 【コネクタ1】ウロミテキサン 300mg/m² (⑤の直前) /iv 5分 側管
 - ⑤ メイン【赤-3】生理食塩水500mL+イホマイド /div 2時間(閉鎖式器具使用)
 - ⑥ メイン【白-1】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
 - ⑦ メイン【白-2】マンニトールS注射液 300mL /div 全開で(15分)
 - ⑧ メイン【白-3】生理食塩水500mL+シスプラチン /div 2時間
 - ⑨ 【コネクタ1】ウロミテキサン 300mg/m² (④開始から4時間後) /iv 5分 側管
 - ⑩ メイン【黄-1】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 2時間
 - ⑪ メイン【黄-2】ソリタT1 500mL+メイロン静注7% 1A /div 2時間
 - ⑫ 【コネクタ1】ウロミテキサン 300mg/m² (④開始から8時間後) /iv 5分 側管

day6~14

皮下注 フィルグラスチム75 μ g

制吐剤セット処方⑧:アレルギー防止目的

Day1 レスタミンコーワ錠10mg 5錠(抗がん剤の30分前)

制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day2~5 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day2~5 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可